

واکسین په عملي ډول

څه وخت باید خپل ماشوم واکسین کړم؟

له ۱۱ کلنۍ څخه وروسته مو د ماشومانو واکسین کول د واکسین ډېر موثریت تضمینوي.
زما ماشوم دی:

- د ۱۱ او ۱۴ کلونو ترمنځ دی: یوازې دوه ډوزې واکسین باید واخلي.
- د ۱۵ او ۱۹ کلونو ترمنځ دی: باید درې ډوزې واکسین واخلي.

اړینه ده وپوهېږئ: د (dTcaP) واکسین لپاره د ملاقات وخت واخلي، کوم چې له ۱۱ تر ۱۳ کلونو عمر درلودونکو کسانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی. له دې سره یو ځای به د (HPV) یو ډوز هم ماشوم ته ولگول شي.

*د ډیفټیریا ضد واکسین (D)، د ټیتانوس (T)، د توري توخې (Ca) او د گوزن ضد واکسین (P).

څنگه کولای شم خپل ماشوم واکسین کړم؟

د دواړو، لویو او زامنو په اړه غواړم لاندې ټکو ته اشاره وکړم:

- یو ډاکټر
- یو ډرمل جوړوونکی
- یوه قابله
- یوه نرسه
- د واکسیناسیون ښاري یا اداري خدمتونه (له خپلې اداري شورا یا اړوند دولتي دفتر څخه معلومات تر لاسه کړئ).

د (HPV) واکسین څومره لګښت لري؟

- د واکسین د هر ډوز ۶۵ فیصده لګښت ستاسې د فنډ صحتي بیمې لخوا ورکول کېږي. باقي ماندې لګښت یې په عمومي توګه د بشپړوونکي بیمې (دوه اړخيزي بیمې او نورو) له لاري بیرته ورکول کېږي.
- واکسین کېدای شي، چې د واکسین په ځینو ښاري او اداري مرکزونو کې وړیا وي.
- هغه کسان چې له پیوستون اضافي روغتيايي بیمې (CSS) او دولتي روغتيايي خدمتونو څخه ګټه پورته کوي، له ټولو لګښتونو معاف دي.

یو خوندي او اغېز کوونکی واکسین څو زما ماشوم له (HPV) سرطانو څخه وساتي.

ستاسې ماشوم د ښوونځي په ۵م صنف کې دی او ستاسې د اجازې وروسته کېدای شي:

- هغه د زدکړو په محل کې د یوه روغتيا پال لخوا واکسین شي.
- هغه ته به دوه ډوزې واکسین ورکړل شي، چې ترمنځ به یې ۶ میاشتي فاصله وي.
- دا واکسینونه تاسې ته په وړیا ډول درکول کېږي.

تر دې دمه پورې د نړۍ په نږدې ۸۰ هیوادونو کې تر ۱۰۰ میلیونه ډېر ماشومان او نوي ځوانان واکسین کړل شوي دي.

په دې اړه د اضافي معلوماتو لپاره له خپل اړوند روغتيا پال سره خبرې وکړئ یا هم دې ادرس ته مراجعه وکړئ: vaccination-hpv.e-cancer.fr



مور هیڅ کله هم ډېر خوندي نه یو.

د (HPV) سرطانو ضد واکسین

د ټولو ۱۱ کلنو او لوړ عمر درلودونکو هلوکانو او نوجونو لپاره.



عملي لارښود

د انساني پاپیلوما ویروس (Human Papillomavirus)

زه د (HPV) سرطانونو ضد واکسين په اړه خبر شوم.

ولي بايد خپل ماشوم واکسين کړم؟

واکسين د (HPV) پر وړاندي ستاسې له ماشوم څخه ساتنه کوي، ځکه چې د (HPV) تر ۹۰ فيصده ډېر انتانونه د سرطان لامل گرځي.

د لاندي خطراتو د مخنيوي لپاره يې د هلوکانو او نجونو دواړو لپاره سپارښتنه کېږي:

تر سرطان مخکې زخموڼه اويا هم د رحم د خولې، ولوا، فرج او مقعد سرطان نرم خو دردناک زخموڼه، چې په پوست کې يا د مقعد او تناسلي ساحې مغز غشا (verrues anogénitales) کې پيدا کېږي.

خوندي او اغېزمن واکسين

د څه باندې ۱۰ کلونو په موده کې په فرانسه کې تر ۶ ميليونه اضافه او په ټوله نړۍ کې تر ۳۰۰ ميليونه د ډېرو ډوزونه سپارښتنه شوې ده.

کلکه نړيواله څارنه

د (HPV) واکسينونو په پراخه کچه استعمال، د نړۍ په کچه په مختلفو هيوادونو کې د څارني سيستمونو تطبيق او د ځانگړو مطالعاتو په پايله کې، چې د (WHO) لخوا هم تاييد شوي، د واکسينونو خونديتوب ثابت شوی دی.

په دې توگه نو، د مثال په توگه، ددې واکسينونو او اتوميمون ناروغيو ترمنځ هېڅ اړيکه نه ده تثبیت شوې.

د (HPV) پر وړاندي د واکسينونو اغېزمنتيا (د سرطانونو او د رحم په خوله کې او په ښځو او سړيو کې تر سرطان مخکنيو زخموڼو کمښت) د اسټرالیا په شان هيوادونو کې، چېرې چې د واکسين شويو ځوانانو تعداد زياد دی، په ښه توگه سره ليدل کېږي.

راځئ د انساني بايلوما وروس په اړه پوهاوی تر لاسه کړو.

د (HPV) څه دی؟

دا (HPV) انساني ورسونه دي، چې د بايلوما وروس په نوم يادېږي.

په سلو کې ۸۰ تنه ښځې او نر د خپل ژوند پرمهال په دغه وروس گکړيږي. د (HPV) انفېکشن معمولاً د څو مياشتو موده کې له منځه ځي، خو يوه کوچنۍ اندازه ممکن پاته شي او ناروغي ته وده ورکړي.

د (HPV) ورسونو او سرطانونو ترمنځ څه اړيکه شتون لري؟

د (HPV) نږدې ۲۰۰ ډولونه موجود دي، چې يو تعداد يې تر سرطان مخکې زخموڼو او سرطان لامل گرځي.

د (HPV) ورسونه د مقعدي غودو د رامنځته کېدو سبب هم کېږي.

پاپلوما ورسونه هر کال په فرانسه کې د سرطان د ۶۴۰۰ نويو پېښو سبب کېږي.

سره له دې، چې د (HPV) ورسونه عمدتاً ښځې متضرره کوي، خو يو پر څلورمه برخه يې سړيو ته ضرر پېښوي.

د (Shield او Hartwig ۲۰۱۵) پر اساس، په ۲۰۱۵ کال کې په فرانسه کې د (HPV) په ناروغيو د اخته شويو ښځو او سړيو تعداد

ښځې	سړي
د تناسلي آلې سرطان / د رحم د خولې او فرج سرطان	۲۰۰
د مقعد سرطان	۱۱۰۰
اوروفارنکس (د خولې، ستوني او نورو) سرطانونه	۴۰۰
د رحم د خولې سرطانونه	۲۹۰۰
د فرج، رحم او مقعد تر سرطان مخکې زخموڼه	له ۲۵۰۰ تر ۳۰۰۰
د رحم د خولې تر سرطان مخکې زخموڼه (CIN 2+)	نږدې ۳۰۰۰۰
مقعدي غودي	نږدې ۵۰۰۰۰