

ክትባት በሥራ ላይ ማዋል

ልጄን መቼ ነው መከተብ ያለብኝ?

ህፃናት ከ 11 አመት ጀምሮ መከተብ አለባቸው፤ ይህ ክትባቱ የበለጠ ውጤታማ እንደሚሆን ያረጋግጣል።

ልጄ የሚያስፈልገው፡-

- በ 11 እና 14 ዓመት መካከል፡- ሁለት መጠን ብቻ ያስፈልጋል፤
- በ15 እና 19 ዓመት አመት መካከል (ማጠናከሪያ)፡- ሶስት መጠን ያስፈልጋል ማወቅ ጥሩ ነው፡- ከ 11 እስከ 13 ዓመት ባለው የዕድሜ ክልል ውስጥ ሊሰጥ የሚችለውን የ TcaP* ማጠናከሪያ ቁጠራ ይጠቀሙ፤ እና በተመሳሳይ ጊዜ እንደ መጠን የ HPV ክትባት ይውሰዱ።

* ላይኛው (ዲ)፣ ተቃራኒው (ቲ)፣ አሰላሳር ፕሮቲን (ሲ) እና ፖሊዮ (ፖ) ላይ የሚደረግ ክትባት።

ልጄን እንዴት መከተብ እችላለሁ?

ለሁሉም ለሴቶችም ለወንዶችም የሚከተለውን ማነጋገር አለብኝ፡-

- ሐኪም
- ፋርማሲስት
- አዋላጅ
- ነርስ
- የማዘጋጃ ቤት ወይም የመምሪያው የክትባት አገልግሎት (በማዘጋጃ ቤት ወይም በመምሪያዎ አማካሪ ማእከል ይጠይቁ)

ሊከሰቱ የሚችሉ የጎንዮሽ ጉዳዮች ምንድን ናቸው?

በክሊኒካዊ ጥናቶች ወቅት በጣም በተደጋጋሚ የታዩት የጎንዮሽ ጉዳዮች ከሌሎቹ ክትባቶች ጋር ተመሳሳይ ናቸው፡- በክትባት በታ አካባቢያዊ ምላሽ (ቀይነት፣ ሕመም እና/ ወይም አብጠት)፣ ራስ ምታት፣ ማዘር ወይም ትኩሳት እና በጣም አልፎ አልፎ የአሰርጂ ምላሾች ወይም የንቃተ ሕሊና ማጣት ሊኖር ይችላል።

እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳዮች በአጠቃላይ ቀላል እና መካከለኛ ጥንካሬ ያላቸው እና ለአጭር ጊዜ የሚቆዩ ናቸው።

የኤች.ፒ.ቪ ክትባት ምን ያህል ያስከፍላል?

- ከእያንዳንዱ የክትባት መጠን 65% የሚሆነው በእርስዎ የህክምና መድን ፈንድ የተሸፈነ ነው። ቀሪው አብዛኛውን ጊዜ የሚከፈለው ተጨማሪ የመድን ፈንድ (የጋራ ኢንሹራንስ፣ ወዘተ) ነው።
- ክትባቱ በተወሰኑ የማዘጋጃ ቤት ወይም የዲፓርትመንቶች ክትባት ማእከላት ነጻ ሊሆን ይችላል።
- ተጨማሪ የህክምና መድን (CSS) እና የመንግስት የህክምና ዕርዳታን ለሚጠቀሙ ምንም የሚከፍሉት የለም።

አስተማማኝ እና ውጤታማ የሆነ ክትባት ለመጠበቅ ልጄን ከ ኤች.ፒ.ቪ ካንሰር።

ልጃችሁ ዕድሜው 5 ዓመት ከሆነ፣ እና እናንተም ፍቃድ ከሰጣችሁ፡-

- በትምህርት ቤት ውስጥ በጤና ባለሙያ ሊከተብ ይችላል፤ ያደርጋል
- ቢያንስ ለ5 ወራት ያህል፤ ሁለት ክትባት መውሰድ፤
- ለዚህ መክፈል አይኖርባችሁም።

እስካሁን፣ ከ 100 ሚሊዮን በላይ ህጻናት እና ታዳጊዎች ወደ 80 በሚጠጉ ሃገራት ክትባት ተሰጥቷቸዋል።

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ የጤና ባለሙያዎን ያነጋግሩ ወይም vaccination-hpv.e-cancer.fr ን ይጎብኙ



AUSTRIALIE.GDD - 03111111111111111111 - INCA - SIREN : 187 512 777 - ግዛት 2024 - DERVACHPVEN24



በኤች.ፒ.ቪ* ካንሰር ላይ የሚደረግ ክትባት ሴቶችን እና ወንዶችን ለጆችን ከ11 ዓመታቸው ጀምሮ እንጠብቅ።

ተግባራዊ መመሪያ

*ኤች.ፒ.ቪ፡- የሰው ፓርቲሎማቫይረስ።

ስለ HPV ካንሰር ክትባት መረጃ ያግኙ።

ልጄን መከተብ ያለብኝ ለምንድን ነው?

ዛሬ፣ የኤች.ፒ.ቪ ክትባት እስከ 90% ካንሰርን ከሚያስከትሉ ኤች.ፒ.ቪዎች ይከላከላል።

ለሴት ልጆች እና ወንዶች ልጆች የሚመከር ከ፡-

- የማህፀን፣ የሴት ብልት፣ የሴት ብልት እና የፊንጢጣ ካንሰር ቅድመ ቁስሎች እና/ወይም የማጎጸን ነቀርሳዎች፤
- ጤናማ፣ ግን የሚያሠቃይ፣ በቆዳው ላይ የሚከሰቱ ቁስሎች፣ ወይም የፊንጢጣ እና የብልት አካባቢ የ ሙከራ ሽፋኖች (አኖጄኔካል ኪንታሮት)።

አስተማማኝና ውጤታማ የሆነ ክትባት

ከ 15 ዓመታት በላይ በዓለም ዙሪያ ከ 300 ሚሊዮን በላይ ክትባቶች ታዘዋል።

ጥብቅ ዓለም አቀፍ ክትትል።

የኤች.ፒ.ቪ ክትባቶች በስፋት ጥቅም ላይ መዋላቸው፣ በአገር አቀፍም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ፣ በተለያዩ አገሮች የተዘረጋው ክትትል፣ እና ልዩ የምርምር ውጤቶች በዓለም ጤና ድርጅት፣ ዕውቅና መሠረት እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ የደህንነት ሪከርዳቸውን አረጋግጠዋል።

ስለዚህ፣ ለምሳሌ፣ በእነዚህ ክትባቶች እና በራስ-ሰር በሽታዎች መካከል ምንም ግንኙነት አልታየም።

የኤች.ፒ.ቪ ክትባት ውጤታማነት ብዙ ቁጥር ያላቸው ወጣት ጎልማሶች በተከተቡባቸው አገሮች ታይቷል፣ ልክ እንደ አውስትራሊያ (ያነሱ ካንሰሮች እና የቅድመ ካንሰር የማህፀን በር ጫፍ እና አኖጄኔካል ኪንታሮት በወንዶችም ሆነ በሴቶች)።

ስለ ሰው ፓፒሎማቫይረስ

ጉዳዩ ይወቁ

ኤች.ፒ.ቪ ምንድን ነው?

ኤች.ፒ.ቪዎች ፓፒሎማቫይረስ የሚባሉ የሰው ቫይረሶች ናቸው።

80% የሚሆኑት ሴቶች እና ወንዶች በህይወት ዘመናቸው ሁሉ ለእነዚህ ቫይረሶች የተጋለጡ ናቸው። የ ኤች.ፒ.ቪ አንጫከሽኖች በአጠቃላይ በጥቂት ወራት ውስጥ ይጠፋሉ፣ ግን ትንሽ ክፍል ሊቆይ እና ወደ በሽታ ሊሸጋገር ይችላል።

በኤች.ፒ.ቪ እና በካንሰር መካከል ያለው ግንኙነት ምንድን ነው?

ወደ 200 የሚጠጉ የኤች.ፒ.ቪ ዓይነቶች አሉ፣ እንዳንዶቹ ቅድመ ካንሰር ጉዳቶችን እና ካንሰር ያስከትላሉ።

HPV ለአኖጄንታዊ ኪንታሮቶች ተጠያቂ ነው።

የኤች.ፒ.ቪ ቫይረስ እንዴት ይተላለፋል?

እነዚህ ቫይረሶች የሚተላለፉት በቀላል የጾታ ብልት ንክኪ፣ ብዙ ጊዜ በግብረ ሥጋ ግንኙነት ወቅት፣ ወደ ውስጥ ሲገባም ሆነ ሳይገባ።

በየአመቱ በፈረንሳይ፣ 6,400 አዳዲስ የካንሰር ጉዳዮች በሰው ልጅ ፓፒሎማቫይረስ ይከሰታሉ።

ፒ.ኤች.ቪ ካንሰር በዋናነት ሴቶችን የሚያጠቃ ቢሆንም፣ ከፋብ በላይ የሚሆኑት ወንዶችን ያጠቃል።

በሴቶች እና በወንዶች ውስጥ በኤች.ፒ.ቪ ምክንያት የሚመጡ በሽታዎች ብዛት ፈረንሳይ ውስጥ በ2015 (እንደ ሺልድ እና ሌሎች፣ ሃርትዊግ እና ሌሎች፣ 2015)

	ወንድ	ሴት
የወንድ ብልት ካንሰር/ የቫልቫ እና የሴት ብልት ካንሰር	100	200
የፊንጢጣ ካንሰር	400	1 100
የአሮፋ-ሪንጅል ካንሰር (አፍ፣ ጉሮሮ...)	1 300	400
የማህፀን በር ካንሰር	—	2 900
በሴት ብልት፣ በቫልቫ፣ በፊንጢጣ ላይ ቅድመ ካንሰር	130	ከ 2 500 እስከ 3 000 ገደማ
የማህፀን ጫፍ ቅድመ ካንሰር (CIN 2+)	—	30 000 ገደማ
አኖጄኔካል ኪንታሮቶች	50 000 ገደማ	50 000 ገደማ