

实践中的疫苗接种

什么时候给我的孩子接种疫苗？

让您的孩子从11岁开始接种疫苗可以保证疫苗更有效。

我的孩子年纪为：

- 11-14岁：只需两剂；
- 15至19岁之间（补种）：需要三剂。

需知：利用为11至13岁之间的孩子预约接种四价疫苗*的同时，为其接种一剂人乳头瘤病毒疫苗。

*白喉(D)、破伤风(T)、无细胞百日咳(Ca)和脊髓灰质炎(P)疫苗。

如何给我的孩子接种疫苗？

针对女孩和男孩，可求助于：

- 医生
- 药剂师
- 助产士
- 护士
- 市或省疫苗接种服务部门
(请咨询您所在的市或省委员会)。

可能出现的副作用？

临床研究中最常见的副作用与其他疫苗相同：注射部位的局部反应（发红，疼痛和/或炎症），

头痛、头晕或发烧，更罕见的是过敏反应或可能失去知觉的不适。

这些副作用通常是轻度或中度的，持续时间短。

接种人乳头瘤病毒疫苗需要多少钱？

- 每剂疫苗由您的社会医疗保险局支付65%的费用。其余的一般由补充机构报销（如互助保险等）。
- 在某些市或省疫苗接种中心可以免费接种疫苗。
- 针对享受补充性国家医疗保险和国家医疗援助的人，无需支付任何费用。

安全有效的疫苗接种 保护我的孩子免受人乳头瘤病毒 癌症的侵害。

您的孩子正在上5e年级，经您同意：


- 可以在学院由专业卫生人员接种疫苗；
- 将接种两剂疫苗，间隔至少5个月；
- 您不需要支付任何费用。

迄今为止，已有近80个国家超过1亿的儿童和青少年接种了疫苗。

如需了解更多信息，
请咨询您的医疗保健专业人员或访问
vaccination-hpv.e-cancer.fr



人乳头瘤癌症* 疫苗接种 让我们保护11岁 起的女孩和男 孩。



*HPV：人乳头瘤病毒。

实用指南

我了解有关疫苗接种预防人乳头瘤病毒癌症的信息

为什么要给我的孩子接种疫苗？

现在，人乳头瘤病毒疫苗可以预防高达90%的导致癌症的人乳头瘤病毒感染。

建议女孩和男孩预防：

- 癌前病变和/或宫颈、外阴、阴道和肛门癌；
- 皮肤上出现的良性但疼痛的病变，或肛门和生殖器区域的粘膜（肛门生殖器疣）。

安全有效的疫苗接种

超过15年，
全球注射超过3亿剂。

严格的国际监督。

人乳头瘤病毒疫苗被广泛使用，许多国家和国际监测以及专业研究的结果证实了其出色的安全性，并得到了世卫组织的认可。

例如，这些疫苗和自身免疫性疾病之间没有联系。

在较多年轻人接种疫苗的国家，证实了人乳头瘤病毒疫苗接种的高效性，如在澳大利亚（减少男性和女性的宫颈癌和癌前病变以及肛门生殖器疣）。

我了解人乳头瘤病毒

人乳头瘤病毒是什么？

HPV被称为人乳头瘤病毒。80%的妇女和男子在其一生中会接触到这些病毒。通常在几个月内，人乳头瘤病毒感染会消失，但一小部分可能会持续存在并发展为疾病。

人乳头瘤病毒和癌症之间有什么联系？

人乳头瘤病毒有近200种类型，其中一些是癌前病变和癌症的诱因。人乳头瘤病毒也是诱发肛门生殖器疣的原因。

人乳头瘤病毒是如何传播的？

这些病毒通过生殖器部位的简单接触即可传播，最常见于性行为中，有或没有插入。

在法国，每年新增6400例由人乳头瘤病毒引发的癌症。

虽然人乳头瘤病毒癌症主要影响女性，但超过四分之一影响男性。

在法国，2015年新增的由人乳头瘤病毒引起的男性和女性病例（根据Shield et al., Hartwig et al., 2015）。

	男性	女性
阴茎癌/外阴和阴道癌	100	200
肛门癌	400	1 100
口咽癌（口腔、咽喉等）	1 300	400
宫颈癌	—	2 900
外阴、阴道、肛门癌前病变	130	大约2500到3000
宫颈癌前病变（CIN 2+）	—	大约3万
肛门生殖器疣	大约5万	大约5万