

LA VACUNACIÓN EN LA PRÁCTICA

¿Cuándo debe vacunarse mi hijo(a)?

Vacunar a su hijo(a) a partir de los 11 años garantiza una mayor eficacia de la vacuna.

Mi hijo(a) tiene:

- entre 11 y 14 años: solo se necesitan dos dosis;
- entre 15 y 19 años (puesta al día): se necesitan tres dosis.

Información útil: aproveche la cita de vacunación de refuerzo de la dTcaP*, prevista entre los 11 y los 13 años, para recibir al mismo tiempo una de las dosis de la vacuna contra el VPH.

* Vacuna contra la difteria (D), el tétanos (T), la tos ferina acelular (Ca) y la poliomielitis (P).

¿Cómo vacunar a mi hijo(a)?

Tanto para las niñas como para los niños, me dirijo a:

- un(a) doctor(a)
- un(a) farmacéutico(a)
- un(a) matron(a)
- un(a) enfermero(a)
- un servicio de vacunación municipal o departamental (pregunte en su *mairie* o consejo departamental).

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?

Los efectos secundarios observados con más frecuencia durante los ensayos clínicos son los mismos que los de otras vacunas: reacciones locales en el lugar de la inyección (enrojecimiento, dolor y/o inflamación), dolores de cabeza, mareos o fiebre y, más raramente, reacciones alérgicas o desmayos con posible pérdida de conocimiento.

Estos efectos secundarios suelen ser de intensidad leve a moderada y de corta duración.

¿Cuánto cuesta la vacunación contra los VPH?

- El 65 % del coste de cada dosis está cubierto por su organismo de seguridad social. El resto suele reembolsarlo el seguro complementario de salud (*mutuelle*, etc.).
- La vacunación puede ser gratuita en algunos centros de vacunación municipales o departamentales.
- Es gratuita para las personas cubiertas por la *Complémentaire Santé Solidaire* (CSS) o la *Aide Médicale d'État*.

UNA VACUNACIÓN SEGURA Y EFICAZ PARA PROTEGER A MI HIJO(A) CONTRA LOS CÁNCERES POR VPH.

SU HIJO(A) ESTÁ EN CINQUIÈME, CON SU AUTORIZACIÓN:

- Un profesional sanitario podrá vacunarlo(a) en el *collège*.
- Recibirá 2 dosis de la vacuna, en un intervalo mínimo de 5 meses.
- No tendrá que pagar nada.

Hasta la fecha, **más de 100 millones** de niños y adolescentes han sido vacunados en casi 80 países.

Para más información, hable con su profesional sanitario o visite vaccination-hpv.e-cancer.fr



VACUNACIÓN CONTRA LOS CÁNCERES POR VPH*

PROTEJAMOS A LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS A PARTIR DE 11 AÑOS.



GUÍA PRÁCTICA

*VPH: Virus del papiloma humano o Papillomavirus humano.

ME INFORMO SOBRE LA VACUNACIÓN CONTRA LOS CÁNCERES POR VPH

¿Por qué debo vacunar a mi hijo(a)?

Hoy en día, la vacunación contra el VPH previene hasta el 90 % de las infecciones por VPH que causan cáncer.

Se recomienda a niñas y niños contra:

- las lesiones precancerosas y/o los cánceres del cuello del útero, vulva, vagina y ano;
- las lesiones benignas pero dolorosas en la piel o las mucosas del ano y la región genital (verrugas anogenitales).

UNA VACUNACIÓN SEGURA Y EFICAZ

Desde hace más de 15 años, más de 300 millones de dosis prescritas en el mundo.

Rigurosa vigilancia internacional.

El uso generalizado de las vacunas contra el VPH, la vigilancia llevada a cabo en muchos países y a escala internacional, así como los resultados de estudios específicos han confirmado su excelente perfil de seguridad, reconocido por la OMS.

Por ejemplo, no se ha demostrado ninguna relación entre estas vacunas y las enfermedades autoinmunes.

La eficacia de la vacunación contra el VPH se ha observado en países donde el número de adultos jóvenes vacunados es elevado, como en Australia (reducción de los cánceres y de las lesiones precancerosas del cuello del útero, así como de las verrugas anogenitales en hombres y mujeres).

ME INFORMO SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

¿Qué son los VPH?

Los VPH son virus humanos llamados papilomavirus. El 80 % de las mujeres y los hombres están expuestos a estos virus a lo largo de su vida. Las infecciones por VPH suelen desaparecer a los pocos meses, pero una pequeña proporción puede persistir y derivar en enfermedad.

¿Cuál es la relación entre los virus del VPH y el cáncer?

Existen casi 200 tipos de VPH, algunos de los cuales provocan lesiones precancerosas y cáncer. Los virus del VPH también son responsables de las verrugas anogenitales.

¿Cómo se transmiten los virus del VPH?

Estos virus se transmiten por simple contacto con los genitales, la mayoría de las veces durante las relaciones sexuales, con o sin penetración.

EN FRANCIA, CADA AÑO SE DAN 6 400 NUEVOS CASOS DE CÁNCER CAUSADOS POR LOS VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO.

Aunque la mayoría de los cánceres provocados por el VPH se dan en mujeres, más de una cuarta parte afectan a hombres.

Número de enfermedades inducidas por el VPH en mujeres y hombres en Francia en 2015 (según Shield et al., Hartwig et al., 2015).

	HOMBRES	MUJERES
Cáncer de pene / Cáncer de vulva y vagina	100	200
Cáncer de ano	400	1 100
Cáncer de orofaringe (boca, garganta, etc.)	1 300	400
Cáncer del cuello del útero	—	2 900
Lesiones precancerosas de vulva, vagina y ano	130	entre 2 500 y 3 000 aprox.
Lesiones precancerosas del cuello del útero (CIN 2+)	—	30 000 aprox.
Verrugas anogenitales	50 000 aprox.	50 000 aprox.