

## VACCINAREA ÎN PRACTIVĂ

### Când este necesar să-mi vaccinez copilul?

Vaccinarea copilului de la vârsta de 11 ani garantează o mare eficacitate a vaccinului.

Copilul meu are:

- între 11 și 14 ani: sunt necesare doar două doze;
- între 15 și 19 ani (catch up): sunt necesare trei doze.

**Bine de știut: profitați de programarea la vaccin pentru rapelul TcaP\*, programată între 11 și 13 ani, pentru a lua una dintre dozele de vaccin HPV în același timp.**

\* Vaccin împotriva difteriei (D), tetanosului (T), pertussis acelular (Ca) și poliomielitei. (P).

### Cum îmi vaccinez copilul?

Atat pentru fete cat si pentru baieti mă adresez la:

- un medic
- un farmacist
- o moașă
- un infirmieră
- un serviciu municipal sau departamental de vaccinare (adresati-vă la primaria sau consiliul departamental).

### Care pot fi efectele adverse?

Efectele adverse cel mai frecvent observate în timpul studiilor clinice sunt aceleași ca pentru alte vaccinuri: reacții locale la locul injectării (roșeață, durere și/sau inflamație), dureri de cap, amețeli sau febră și, mai rar, reacții alergice sau stări de rău cu posibilă pierdere a cunoștinței. Aceste efecte adverse sunt, în general, de intensitate ușoară sau moderată și de scurtă durată.

### Care este prețul vaccinului HPV?

- Fiecare doză de vaccin este acoperită în proporție de 65% de către fondul dumneavoastră de asigurări de sănătate. Restul se rambursează în general prin asigurări complementare (asigurări mutuale etc.).
- Vaccinarea poate fi gratuită în anumite centre de vaccinare municipale sau departamentale.
- Pentru persoanele care beneficiază de Solidaritate Suplimentară de Sănătate (CSS) și de ajutor medical de stat, acest serviciu este gratuit.

# O VACCINARE SIGURĂ ȘI EFICIENTĂ PENTRU A PROTEJA COPILUL MEU ÎMPOTRIVA CANCERELOR CAUZATE DE HPV.

**COPILUL DUMNEAVOASTRĂ ESTE ÎNSCRIS ÎN CLASA A V-a, CU AUTORIZAȚIA DUMNEAVOASTRĂ:**

- el va putea fi vaccinat la colegiu de către un profesionist din domeniul sănătății;
- va primi două doze de vaccin, la un interval de cel puțin 5 luni;
- nu va fi necesar să achitați nimic.

Până în prezent, **peste 100 de milioane** de copii și adolescenți din aproape 80 de țări au fost vaccinați.

Pentru a afla mai multe, discutați cu profesionistul dumneavoastră din domeniul sănătății sau vizitați [vaccination-hpv.e-cancer.fr](https://vaccination-hpv.e-cancer.fr)



## VACCINAREA ÎMPOTRIVA CANCERELOR CAUZATE DE HPV\*

SĂ PROTEJĂM FETELE ȘI BĂIEȚII ÎNCEPÂND CU VÂRSTA DE 11 ANI.



GHID PRACTIC

\*HPV : Virusul Papiloma Uman sau Papilomavirusuri.

## MĂ INFORMEZ DESPRE VACCINAREA ÎMPOTRIVA CANCERELOR CAUZATE DE HPV

### De ce ar trebui să îmi vaccinez copilul?

În prezent, vaccinarea împotriva HPV previne până la 90% din infecțiile cu HPV care cauzează cancer.

Este recomandată pentru fete și băieți împotriva:

- leziunilor precanceroase și/sau cancerelor de col uterin, vulvă, vagin și anus;
- leziunilor benigne, dar dureroase, care apar pe piele sau pe mucoasele anusului și regiunii genitale (veruci anogenitale).

### UN VACCIN SIGUR ȘI EFICIENT

De mai bine de 15 ani, au fost administrate peste 300 de milioane de doze în întreaga lume.

O supraveghere internațională riguroasă.

Utilizarea pe scară largă a vaccinurilor împotriva HPV, supravegherea implementată în numeroase țări și la nivel internațional, precum și rezultatele studiilor specifice au confirmat profilul lor excelent de siguranță, recunoscut de OMS.

Astfel, de exemplu, nu s-a demonstrat nicio legătură între aceste vaccinuri și bolile autoimune.

Eficacitatea vaccinării împotriva HPV este observată în țările în care numărul tinerilor adulți vaccinați este mare, cum ar fi Australia (reducerea cazurilor de cancer și leziuni precanceroase ale colului uterin, precum și a verucilor anogenitale la bărbați și femei).

## MĂ INFORMEZ DESPRE PAPILOMAVIRUSURILE UMANE

### Ce sunt HPV?

HPV sunt virusuri umane numite papilomavirusuri. 80% dintre femei și bărbați sunt expuși acestor virusuri pe parcursul vieții lor. Infecțiile cu HPV dispar de obicei în câteva luni, dar o mică proporție poate persista și evolua în boală.

### Care este legătura între virusurile HPV și cancer?

Există aproape 200 de tipuri de HPV, dintre care unele sunt responsabile pentru leziuni precanceroase și cancer. HPV sunt, de asemenea, responsabile pentru veruci anogenitale.

### Cum se transmit virusurile HPV?

Aceste virusuri se transmit prin contact simplu la nivelul părților genitale, cel mai frecvent în timpul raporturilor sexuale, cu sau fără penetrare.

**ÎN FIECARE AN, ÎN FRANȚA, 6400 DE CAZURI NOI DE CANCER SUNT CAUZATE DE VIRUSURILE PAPILOMA UMANE.**

Și, deși cancerul cauzat de HPV afectează în majoritate femeile, mai mult de un sfert dintre cazuri afectează bărbații.

Numărul bolilor induse de HPV la femei și bărbați în Franța în 2015 (conform Shield și al., Hartwig și al., 2015).

	BĂRBAȚI	FEMEI
Cancere ale penisului / Cancere ale vulvei și vaginului	100	200
Cancere ale anusului	400	1 100
Cancere ale orofaringelui (gură, gât...)	1 300	400
Cancere ale colului uterin	—	2 900
Leziuni precanceroase ale vulvei, vaginului și anusului	130	Aproximativ de la 2 500 până la 3 000
Leziuni precanceroase ale colului uterin (CIN 2+)	—	aproximativ 30 000
Veruci anogenitale	aproximativ 50 000	aproximativ 50 000