

ВАКЦИНАЦІЯ НА ПРАКТИЦІ

Коли зробити щеплення моїй дитині ?

Щеплення дитини з 11 років гарантує більшу ефективність вакцини.

Моя дитина має :

- від 11 до 14 років : потрібно тільки дві дози вакцини ;
- між 15 та 19 роками (наздогін) : три дози необхідні.

Корисно знати : скористайтеся записом на щеплення ТсаР* у віці від 11 до 13 років, щоб одночасно отримати одну з доз вакцини проти ВПЛ.

*Вакцина проти дифтерії (D), правця (T), ацелюлярного кашлюку (Ca) та поліомієліту (P).

Як вакцинувати мою дитину ?

Як для дівчаток, так і для хлопчиків, я звертаюся до :

- лікаря
- фармацевта
- акушерки
- медбрата
- муніципальна чи відомча служба вакцинації (запитайте у мерії чи у департаментській раді).

Які можуть бути побічні ефекти ?

Побічні ефекти, які найчастіше спостерігалися під час клінічних досліджень, такі ж, як і для інших вакцин : місцеві реакції в місці ін'єкції (почервоніння, біль та/або запалення), головний біль, запаморочення або лихоманка та, рідше, алергічні реакції або дискомфорт із можливою втратою свідомості.

Ці побічні ефекти, як правило, мають легку або помірну інтенсивність та короточасні.

Скільки коштує вакцинація проти ВПЛ ?

- Кожна доза вакцини покривається вашим фондом медичного страхування на 65%. Решта зазвичай сплачується шляхом додаткового страхування (взаємного та ін.).
- Вакцинація може бути безкоштовною в певних муніципальних або відомчих центрах вакцинації.
- Для людей, які користуються програмами додаткової медичної солідарності (CSS) і державної медичної допомоги, платити нічого не потрібно.

НАДІЙНА Й ЕФЕКТИВНА ВАКЦИНАЦІЯ, ЩОБ ЗАХИСТИТИ МОЮ ДИТИНУ ВІД РАКУ ВПЛ.

**ВАША ДИТИНА ХОДИТЬ ДО 5 КЛАСУ,
З ВАШОЮ ЗГОДОЮ :**

- вона може бути вакцинована у коледжі медичним працівником ;
- вона прийме дві дози вакцини, з інтервалом у 5 місяців мінімум ;
- вам нічого не потрібно платити.

На сьогодні **понад 100 мільйонів** дітей та підлітків були вакциновані у майже 80 країнах.

Щоб дізнатися більше, поговоріть зі своїм медичним працівником або відвідайте сайт vaccination-hpv.e-cancer.fr



ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ РАКУ ВПЛ*

ЗАХИСТИМО
ДІВЧАТОК І
ХЛОПЧИКІВ
ВІД 11 РОКІВ.



ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

*ВПЛ : людський папілома вірус або вірус папіломи людини.

Я ШУКАЮ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ РАКУ ВПЛ

Навіщо робити вакцину моїй дитині ?

Сьогодні вакцинація проти ВПЛ запобігає до 90% ВПЛ-інфекцій, які викликають рак.

Вона рекомендується дівчаткам і хлопчикам проти:

- передракових уражень та/або раку шийки матки, вульви, піхви і заднього проходу;
- доброякісних, але болючих уражень, які з'являються на шкірі або слизовій оболонці заднього проходу та області статевих органів (аногенітальні бородавки).

НАДІЙНА Й ЕФЕКТИВНА ВАКЦИНАЦІЯ

Понад 15 років, понад 300 мільйонів доз призначено у всьому світі.

Пильний міжнародний моніторинг.

Широке використання вакцин проти ВПЛ, нагляд, який здійснюється в багатьох країнах і на міжнародному рівні, а також результати спеціальних досліджень підтвердили їх відмінний профіль безпеки, визнаний ВООЗ.

Так, наприклад, не було продемонстровано жодного зв'язку між цими вакцинами та ауто-імунними захворюваннями

Ефективність вакцинації проти ВПЛ спостерігається в країнах, де кількість щеплення серед молодих людей є вагомим, як, наприклад, в Австралії (зменшення випадків раку та передракових уражень шийки матки та аногенітальних бородавок у чоловіків і жінок).

Я ШУКАЮ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ПАПІЛОМАВІРУСУ ЛЮДИНИ

ВПЛ, що це ?

ВПЛ - це віруси людини, які називаються вірусами папіломи. 80% жінок і чоловіків піддаються впливу цих вірусів протягом життя. Інфекції ВПЛ зникають зазвичай протягом кількох місяців, але невелика частина може зберігатися та прогресувати до захворювання.

Який зв'язок між вірусами ВПЛ і раком ?

Існує близько 200 типів ВПЛ, деякі з яких викликають передракові ураження та рак. ВПЛ також викликає аногенітальні бородавки.

Як передається вірус ВПЛ ?

Ці віруси передаються при простому контакті на рівні статевих органів, найчастіше під час статевого акту, з проникненням або без нього.

КОЖНОГО РОКУ, У ФРАНЦІЇ, 6 400 НОВИХ ВИПАДКІВ РАКУ СПРИЧИНЕНІ ВІРУСОМ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ.

У той час як рак ВПЛ вражає переважно жінок, більше чверті випадків стосуються чоловіків.

Кількість захворювань, спричинених ВПЛ, у жінок і чоловіків у Франції в 2015 році (за даними Shield et al., Hartwig et al., 2015).

	ЧОЛОВІКИ	ЖІНКИ
Рак статевого члена / Рак вульви та піхви	100	200
Рак заднього проходу	400	1 100
Рак ротоглотки (рота, горла тощо)	1 300	400
Рак шийки матки	—	2 900
Передракові ураження вульви, піхви, заднього проходу	130	приблизно від 2 500 до 3 000
Передракові ураження шийки матки (CIN 2+)	—	приблизно 30 000
Аногенітальні бородавки	приблизно 50 000	приблизно 50 000