


# HPV یا انسانی پیپیلوما وائرس کے خلاف ویکسینیشن



یہ ویکسین میرے بچے کو وائرس سے بچانے کے  
لیے بہت اہم ہے۔



11 سال اور اس سے زیادہ عمر کی لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے  
یہ ویکسین واجب نہیں ہے۔  
لیکن یہ سختی سے سفارش کی جاتی ہے۔




## HPV کیا ہیں؟

HPV انسانی وائرس ہیں جنہیں پیپیلوما وائرس کہتے ہیں۔


HPVs یہ وائرس بہت زیادہ ہیں۔

تقریباً 200 مختلف پیپیلوما وائرس ہیں۔



HPV بہت متعدی ہے:

اس کا مطلب ہے کہ وہ آسانی سے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں میں یہ وائرس ہوتے ہیں۔



HPV وائرس اکثر پہلے جنسی تعلقات کے دوران منتقل ہوتے ہیں۔ کنڈوم مکمل طور پر HPV سے

حفاظت نہیں کرتے۔

ہمارا جسم اکثر ان وائرسوں کو ختم کرتا ہے۔


جب ہمارے جسم کی طرف سے ختم نہیں کیا جاتا ہے، تو وائرس کا سبب بن سکتا ہے:



- precancerous گھاووں،
- یہ کہنا ہے کہ جب ابھی تک کوئی کینسر نہیں ہے،
- کینسر،
- اینوجنیٹل میسے

یہ میسے مقعد اور عضو تناسل پر ظاہر ہوتے ہیں۔ میسے سنگین نہیں ہوتے لیکن چوٹ لگتے ہیں۔


کوئی بھی مرد اور عورت دونوں، کینسر اور میسے سے قبل کے زخموں کو حاصل کر سکتا ہے۔



یہ فرانس میں ہر سال سبب بنتا ہے:

- 100,000 میسے
- کینسر کے 6,400 نئے کیسز

ویکسین ایک ایسی دوا ہے جو حفاظتی ہے۔  
یہ یقینی ہے۔



یہ ویکسین آپ کے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔

• قبل از وقت گھاووں اور/یا کینسر:


• گریوا کا،

• vulva کے،

• اندام نہانی

• مقعد کا،


• اینوجنیٹل مسے



ویکسین موثر اور محفوظ ہے۔

دنیا بھر میں 100 ملین سے زیادہ بچوں کو پہلے ہی ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔

## میرے بچے کو کس عمر میں ٹیکہ لگانا چاہیے؟



لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے 11 سال کی عمر سے اور 14 سال تک کی ویکسینیشن کی سفارش کی جاتی ہے۔


آپ کے بچے کو جتنی جلدی ویکسین لگائی جاتی ہے، ویکسین اتنی ہی زیادہ اس کو بیماری سے بچاتی ہے۔  
حفاظت کے لیے آپ کو ویکسین کی 2 خوراکیں درکار ہیں۔  
دوسرا انجکشن نہ بھولیں، 5 سے 13 ماہ بعد۔

پہلا مہینہ VACCIN 1	دوسرا مہینہ	تیسرا مہینہ	چوتھا مہینہ
پانچواں مہینہ	چھٹا مہینہ VACCIN 2	ساتواں مہینہ	آٹھواں
نواں مہینہ	دسواں مہینہ	گیارہواں	بارہواں

آپ کا بچہ ایک ہی وقت میں وصول کر سکتا ہے:

- HPV ویکسین کی ایک خوراک،
- ایک اور ویکسین، مثال کے طور پر اس کی TcaP بوسٹر ویکسین۔ TcaP ویکسین بوسٹر کا منصوبہ 11 سے 13 سال کی عمر کے درمیان ہے۔
- dTcaP خناق، تشنج، acellular pertussis اور پولیو کے خلاف ویکسین ہے۔




## اگر میں اپنے بچے کو ویکسین دینا بھول گیا ہوں؟



**15 سے 19 سال کی عمر کے درمیان اب بھی ویکسینیشن ممکن ہے۔**

اس کے بعد آپ کو حفاظت کے لیے ویکسین کی 3 خوراکیوں کی ضرورت ہے۔

دوسرا اور تیسرا انجیکشن نہ بھولیں، 2 ماہ بعد اور پھر پہلے انجیکشن کے 6 ماہ بعد۔

پہلا مہینہ 	دوسرا مہینہ	تیسرا مہینہ 	چوتھا مہینہ
پانچواں مہینہ	چھٹا مہینہ	ساتواں مہینہ 	آٹھواں
نواں مہینہ	دسواں مہینہ	گیارہواں	بارہواں

## میرے بچے کو کون ویکسینیشن کر سکتا ہے؟



ڈاکٹر



فارماسٹ



دائی



نرس



آپ ویکسینیشن سینٹر میں بھی جا سکتے ہیں۔

## اس کی قیمت کتنی ہے؟

آپ کا ہیلتھ انشورنس فنڈ ویکسین کی ہر خوراک کی قیمت کا 65% واپس کرتا ہے۔

مثال کے طور پر، 100€ میں سے، ہیلتھ انشورنس آپ کو 65€ واپس کرتا ہے۔

باقی کی طرف سے ادائیگی کی جا سکتی ہے۔



BENEFICIAIRE NOM - PRENOM		PHAR	OPAU	DENT	ALUM	LARA	EXTE	COBL	TRAN	HOCF	HOSD	CHAM	OBSQ
XXXXXX XXXX	123456789 12 P22017	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
XXXXXX XXXX	123456789 12 P22017	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
XXXXXX XXXX	123456789 12 P22017	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

## ویکسینیشن مفت ہے:

- کالج میں، 5ویں جماعت کے طلباء کے لیے،
- آپ کے شہر یا محکمہ کے مخصوص ویکسینیشن مراکز میں،
- اگر آپ کے پاس سالیڈیریٹی سپلیمنٹری ہیلتھ یا ریاستی طبی امداد ہے

## آپ کا بچہ کالج میں، 5ویں کلاس میں ہے۔

آپ کی اجازت سے،  
آپ کے بچے کو اسکول میں ٹیکہ لگایا جا سکتا ہے:

- ڈاکٹر کے ذریعہ،
- ایک فارماسسٹ کے ذریعہ،
- ایک دایہ کے ذریعہ،
- ایک نرس کے ذریعہ۔



آپ کے بچے کو دو بار ٹیکہ لگایا جائے گا۔  
اس کے پاس اپنا صحت کا ریکارڈ ہونا ضروری ہے۔  
ویکسینیشن مفت ہوگی۔

اگر آپ کا بچہ پہلے ہی ویکسین کا اپنا پہلا انجکشن لگا چکا ہے، تو وہ  
اسکول میں دوسرا انجیکشن لے سکے گا۔

دو ہزار تئیس میں بارہ سال کی عمر کے چار لاکھ بچوں کو انجیکشن لگائے گئے۔




## مزید جاننے کے لیے

اپنے ڈاکٹر سے بات کریں یا [e-cancer.fr](http://e-cancer.fr) پر جائیں۔




## اپنے بچے سے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے

تقرری پر ہمارا صفحہ وقف  
[preventionenfant.e-cancer.fr](http://preventionenfant.e-cancer.fr)



## ویکسینیشن کے بارے میں مزید جاننے کے لیے

معلومات پر [www.santebd.org](http://www.santebd.org) مفت دستیاب ہے۔



عکاسی: ©SantéBD



FALC کتابچہ  
دانشورانہ معذوری والے لوگوں کے ذریعہ دوبارہ  
پڑھنے اور سمجھنے میں آسان ای سیٹ اونوول  
(Unapei 34)  
©یورپی لوگو پڑھنے میں آسان: شمولیت یورپ۔ ویب  
سائٹ [www.easy-to-read.eu](http://www.easy-to-read.eu) پر مزید معلومات۔